



## CYTOPATHOS, spol. s r.o.

Limbová 5, 830 07 Bratislava 37, P. O. BOX 108  
fax: 02/5954 3481, tel.: 02/5954 2477  
mob.: 0917/625 048, www.cytopathos.sk  
e-mail: cytopathos@cytopathos.sk



# Odporúčaný postup odberov pre gastroenterológov

| Suspektné ochorenie               | Požiadavky na odber vzoriek  |
|-----------------------------------|--|
| Alergická eozinofilná ezofagitída | aspoň po jednej vzorke z orálnej, strednej a aborálnej časti pažeráka, prípadne aj vzorky žalúdočnej a duodenálnej sliznice  |
| Refluxná ezofagitída              | <p><b>1. Potvrdenie diagnózy refluxnej ezofagitídy alebo podozrenie na Barrettov pažerák:</b><br/>viac vzoriek, najmenej 4, najmä pod Z-líniou, a to aj z miest, ktoré sa makroskopicky javia ako proximálny okraj žalúdku</p> <p><b>2. Detekcia dysplázie v Barrettovom pažeráku:</b><br/>kvadrantový odber vzoriek sliznice, každé 2 cm v úseku siahajúcim od „gastroezofageálnej junkcie“ po distálny okraj dlaždicového epitelu pažeráka + odber z endoskopicky suspektných miest</p> <p><b>3. Včasná detekcia invazívneho karcinómu u pacientov s ťažkou dyspláziou:</b><br/>kvadrantový odber vzoriek sliznice, každé 2 cm v úseku siahajúcim od „gastroezofageálnej junkcie“ po distálny okraj dlaždicového epitelu pažeráka + odber z endoskopicky suspektných miest</p> |
| Chronická gastritída              | <p><b>1. Potvrdenie chronickej gastritídy:</b><br/>2 vzorky z antra + 2 vzorky z tela + 1 vzorka z incisura angularis</p> <p><b>2. Detekcia dysplázie:</b><br/>minimálne rovnaký odber ako na potvrdenie chronickej gastritídy + odber z endoskopicky suspektných miest</p>  |
| Celiakia                          | 1 vzorka z bulbu duodéna + 1 vzorka z proximálneho duodéna + 1 vzorka z distálneho duodéna + sérologia, prípadne aj vzorka z antra žalúdka   |
| IBD                               | <p><b>Detekcia dysplázie:</b><br/>cca 33 vzoriek, a to po päť až šesť vzoriek z colon ascendens, transversum, descendens, zo sigmy, horného rekta a dolného rekta + odber z endoskopicky suspektných miest</p> <p><b>alebo</b><br/>kvadrantové biopsie odoberané v intervaloch dlhých 10 cm z oblastí postihnutých kolítidou, v rektosigme po 5 cm + odber z endoskopicky suspektných miest</p>  |
| Mikroskopická kolitída            | aspoň po dve vzorky z pravého colon (predovšetkým z céka) a z rektosigmy   |